

Тема 5.2 «Система органов дыхания»

Введение

Дыхательная система (*systema respiratorium*) обеспечивает газообмен между организмом и внешней средой, поддерживая оптимальный уровень парциальных давлений кислорода (pO_2) и углекислого газа (pCO_2) в артериальной крови — необходимое условие для аэробного метаболизма тканей. Физиологическая роль дыхания не исчерпывается вентилицией и диффузией газов: система участвует в кислотно-щелочном гомеостазе (регуляция pCO_2 как компонента буферной системы H_2CO_3/HCO_3^-), терморегуляции, фильтрации и осаждении аэрозолей, а также в неспецифической защите (мукоцилиарный клиренс, иммунный барьер слизистой).

Цель лекции — сформировать системное понимание строения воздухоносных путей и респираторного отдела, механизмов вентилиции и газообмена, а также прикладную значимость этих знаний для клинической практики (оценка функции внешнего дыхания, интерпретация спирометрии, понимание патогенеза обструктивных и рестриктивных нарушений).

1. Значение дыхания для организма: метаболический и гомеостатический контекст


Дыхание обеспечивает три ключевые функции:

1. **Газообмен (внешнее дыхание)** — диффузия O_2 и CO_2 через аэрогематический барьер (*barrierum aerogematicum*) на уровне альвеол. Движущей силой служит градиент парциальных давлений: в альвеолярном воздухе $pO_2 \approx 100$ мм рт. ст., $pCO_2 \approx 40$ мм рт. ст.; в венозной крови малого круга $pO_2 \approx 40$ мм рт. ст., $pCO_2 \approx 46$ мм рт. ст. Это обеспечивает насыщение гемоглобина кислородом и удаление CO_2 .
2. **Кислотно-щелочной гомеостаз** — регуляция pCO_2 через изменение минутной вентилиции. Согласно уравнению Гендерсона–Хассельбаха, $pH \approx 6,1 + \log([HCO_3^-]/(0,03 \times pCO_2))$, дыхательная система способна быстро (в течение минут) корректировать pH крови.
3. **Метаболическая и барьерная функции** — лёгкие участвуют в активации/инактивации биологически активных веществ (например, превращение ангиотензина I в ангиотензин II под действием АПФ в эндотелии лёгочных капилляров), а также в защите от ингаляционных патогенов и частиц (мукоцилиарный аппарат, альвеолярные макрофаги, секреторный IgA).

Терминологический аппарат:

- *Ventilatio pulmonum* — циклическое движение воздуха по воздухоносным путям.
- *Diffusio gasium* — пассивный транспорт газов по градиенту парциального давления.
- *Transportus gasium* — перенос O_2 (преимущественно в виде оксигемоглобина) и CO_2 (в виде HCO_3^- , карбаминогемоглобина и растворённого CO_2).

2. Строение воздухоносных путей: анатомия стенки и функциональная морфология



Воздухоносные пути (*tractus respiratorii*) включают: полость носа (*cavitas nasi*), носоглотку (*pars nasalis pharyngis*), гортань (*larynx*), трахею (*trachea*) и бронхиальное дерево (*arbor bronchialis*). Их основная функция — проведение, кондиционирование (согревание, увлажнение, очистка) и защита респираторного отдела.

Особенности строения стенки воздухоносных органов

Стенка воздухоносных путей имеет типичную четырёхслойную структуру:

1. **Tunica mucosa** (слизистая оболочка):
 - *Lamina epithelialis*: в большинстве отделов — псевдомногослойный мерцательный эпителий (*epithelium pseudostratificatum ciliatum*) с бокаловидными клетками (*cellulae caliciformes*), секретирующими слизь. В зонах повышенной механической нагрузки (например, надгортанник, голосовые складки) — многослойный плоский неороговевающий эпителий (*epithelium stratificatum planum noncornificatum*).
 - *Lamina propria mucosae*: рыхлая волокнистая соединительная ткань с венозными сплетениями (особенно выражены в носовых раковинах — *conchae nasales*), обеспечивающими терморегуляцию вдыхаемого воздуха.
2. **Tela submucosa** (подслизистая основа): содержит смешанные слизисто-серозные железы (*glandulae mucosae et serosae*), дополняющие защитную функцию эпителия.

3. **Tela fibromusculocartilaginea** (фиброзно-мышечно-хрящевая оболочка): хрящевые элементы (гиалиновый хрящ — *cartilago hyalina*) обеспечивают жёсткость и предотвращают спадение просвета; гладкомышечные пучки (*musculi lissi*) регулируют калибр бронхов.
4. **Tunica adventitia** (адвентиция): наружная соединительнотканная оболочка, фиксирующая орган к соседним структурам.

Доказательность: классическая физиология подтверждает, что мукоцилиарный клиренс (транспорт слизи ресничками со скоростью ~5–10 мм/мин) является основным механизмом самоочищения дыхательных путей. Нарушение этого механизма (например, при синдроме Картагенера) приводит к хроническим инфекциям и бронхоэктазам.

3. Придаточные пазухи носа: анатомия и значение

Придаточные пазухи носа (*sinus paranasales*) — воздухоносные полости в костях черепа, выстланные слизистой оболочкой и сообщающиеся с полостью носа:

- *Sinus maxillaris* (верхнечелюстная пазуха) — самая крупная, дренируется в средний носовой ход.
- *Sinus frontalis* (лобная пазуха) — расположена в лобной кости.
- *Cellulae ethmoidales* (ячейки решётчатого лабиринта) — передние, средние и задние, открываются в средний и верхний носовые ходы.
- *Sinus sphenoidalis* (клиновидная пазуха) — дренируется в сфеноэтмоидальный карман.




Функциональное значение:

- Уменьшение массы черепа за счёт пневматизации костей.
- Резонаторная функция для голоса.
- Дополнительная кондиционирующая и защитная роль (увеличение площади слизистой для согревания и увлажнения воздуха).
- Амортизационная функция при травмах.

Термин: *Ostium maxillare* — верхнечелюстное отверстие, критическое для дренажа верхнечелюстной пазухи; его обструкция часто приводит к острому синуситу.

4. Лёгкие: местоположение, строение, сегментарная организация

Лёгкие (*pulmones dexter et sinister*) расположены в грудной полости, по обе стороны от средостения (*mediastinum*), покрыты висцеральной плеврой (*pleura visceralis*). Правое лёгкое состоит из трёх долей (*lobus superior, medius, inferior*), левое — из двух (*lobus superior et inferior*), что обусловлено наличием сердечной вырезки (*incisura cardiaca*).



Сегментарное строение

Бронхолёгочный сегмент (*segmentum bronchopulmonale*) — анатомо-функциональная единица лёгкого, вентилируемая сегментарным бронхом (*bronchus segmentalis*) и снабжаемая одноимённой ветвью лёгочной артерии. Всего в лёгких 18–20 сегментов (10 справа, 8–10 слева). Такая организация важна для хирургии (сегментэктомия) и лучевой диагностики.

Микроскопическая структура

- **Бронхиальное дерево:** от главных бронхов (*bronchi principales*) до терминальных бронхиол (*bronchioli terminales*) — проводящая зона.
- **Респираторная зона:** начинается с респираторных бронхиол (*bronchioli respiratorii*), включает альвеолярные ходы (*ductuli alveolares*) и альвеолярные мешочки (*sacculi alveolares*), заканчивающиеся альвеолами (*alveoli pulmonales*).
- **Альвеолы:** выстланы альвеолоцитами I типа (тонкие плоские клетки для газообмена) и альвеолоцитами II типа (секретируют сурфактант — смесь фосфолипидов и белков, снижающих поверхностное натяжение и предотвращающих спадение альвеол).

Аэрогематический барьер включает:

- цитоплазму альвеолоцита I типа,
- общую базальную мембрану,
- цитоплазму эндотелиоцита капилляра.

Его толщина составляет $\sim 0,2\text{--}0,5$ мкм, что обеспечивает эффективную диффузию газов.

5. Лёгочное дыхание: вентиляция и механика дыхательных движений

Лёгочное (внешнее) дыхание — это циклический процесс вентиляции, обеспечивающий обновление альвеолярного воздуха и поддержание стабильных pO_2 и pCO_2 .

Механизм вдоха (inspiratio)

Вдох — активный процесс, инициируемый сокращением диафрагмы (*musculus diaphragma*) и наружных межрёберных мышц (*musculi intercostales externi*). Это приводит к:

- Увеличению вертикального, переднезаднего и поперечного размеров грудной клетки.
- Снижению внутриплеврального давления (в норме на выдохе ≈ -5 см H_2O , на пике вдоха ≈ -8 см H_2O).
- Растяжению лёгких и снижению внутриальвеолярного давления ниже атмосферного, что вызывает приток воздуха.

Физиологический закон: согласно закону Бойля–Мариотта, при постоянной температуре давление газа обратно пропорционально его объёму ($P_1V_1 = P_2V_2$). Увеличение объёма грудной полости снижает давление в лёгких, создавая градиент для притока воздуха.

Механизм выдоха (expiratio)

Спокойный выдох — пассивный процесс, обусловленный эластической тягой лёгких и расслаблением дыхательных мышц. При форсированном выдохе подключаются внутренние межрёберные мышцы (*musculi intercostales interni*) и мышцы брюшного пресса, активно уменьшая объём грудной полости.

Ключевые объёмы и ёмкости (по данным классической физиологии):

- Дыхательный объём (ДО, TV) ≈ 500 мл.
- Резервный объём вдоха (РОВд, IRV) ≈ 3000 мл.
- Резервный объём выдоха (РОВыд, ERV) ≈ 1100 мл.
- Остаточный объём (ОО, RV) ≈ 1200 мл.
- Жизненная ёмкость лёгких (ЖЁЛ, VC) = ДО + РОВд + РОВыд ≈ 4600 мл.

Эти показатели измеряются методом спирометрии и используются для дифференциальной диагностики обструктивных (снижение ОФВ1/ФЖЁЛ) и рестриктивных (снижение ЖЁЛ) нарушений.

Заключение: фундаментальные выводы и прикладное значение

1. Дыхательная система — не просто «трубопровод» для воздуха, а сложный multifunctional орган, интегрированный в метаболические, защитные и регуляторные процессы организма.
2. Строение стенки воздухоносных путей отражает их функцию: жёсткий каркас (хрящи) предотвращает коллапс, мерцательный эпителий и железы обеспечивают очистку и увлажнение, гладкомышечные элементы — регуляцию просвета.
3. Сегментарная организация лёгких и наличие аэрогематического барьера оптимизируют газообмен и позволяют проводить целенаправленные хирургические вмешательства.
4. Механика дыхания основана на физических законах (Бойля–Мариотта) и нейромышечном контроле; количественные показатели вентиляции (ДО, ЖЁЛ и др.) — ключевые маркеры функции внешнего дыхания.
5. Для профессиональной деятельности (медицинская практика, сестринское дело, физиотерапия) понимание анатомии и физиологии дыхания необходимо для интерпретации функциональных тестов, оценки дыхательной недостаточности, оказания неотложной помощи при обструкции дыхательных путей и ИВЛ.